

Segunda-Feira, 23 de Dezembro de 2024

Uso de Ozempic pode levar à perda da visão, revela estudo dinamarquês

O número de casos saltou de uma média de 60 a 70 por ano para cerca de 150, evidenciando uma tendência preocupante

Jovem Pan News

Pacientes com diabetes tipo 2 que utilizam Ozempic podem enfrentar um risco elevado de danos no nervo óptico, condição que pode resultar em perda de visão. Essa conclusão é fruto de dois estudos recentes realizados pela Universidade do Sul da Dinamarca, que corroboram achados prévios de uma pesquisa conduzida nos Estados Unidos.

De acordo com o estudo americano, o uso de Ozempic mais que duplica a probabilidade de desenvolver Neuropatia Óptica Isquêmica Não Arterítica (NAION), um distúrbio que compromete a circulação sanguínea no nervo óptico, afetando gravemente a visão.

Os pesquisadores compararam dados de pacientes que utilizaram Ozempic com aqueles tratados por outras terapias, confirmando que o risco de desenvolver NAION é duas vezes maior entre os usuários do medicamento. Os estudos reforçam a necessidade de maior cautela no uso do remédio, que é amplamente utilizado no tratamento do diabetes e, recentemente, ganhou popularidade por sua eficácia na perda de peso.